○ 클로파지민 단일제(캡슐제) 허가사항 변경명령(안)

효능・효과

1. 한센병

1) 나병종나병과 중간나병

2) 나병결절홍반과 같은 나병반응

용법・용량

1. 나병종나병과 중간나병

클로파지민으로서 1회 50mg을 매일 투여하거나 1회 100mg을 주 3회 투여한다.

2. 나병결절홍반과 같은 나병반응

이 약으로서 1일 1회 300mg을 보통 3개월간 투여한다. 투여기간 중 나병반응이 나타나면 즉시 나병반응 억제효과가 적절히 유지되는 수준까지 점차적으로 감량한다.

(이하 동일)

○ 클로파지민 단일제(캡슐제) 허가사항 변경대비표

항목	기허가사항	변경(안)
효능효과	1. 한센병 1) 나병종나병과 중간나병 2) 답손에 내성이 있는 나병종나병과 중간나병 3) 나병결절홍반과 같은 나병반응	1. 한센병 1) 나병종나병과 중간나병 <삭 제> 2) 나병결절홍반과 같은 나병반응
용법용량	1. 나병종나병과 중간나병 클로파지민으로서 1회 50mg을 매일 투여하거나 1회 100mg을 주 3회 투여한다. 2. 답손에 내성이 있는 나병종나병과 중간나병 이 약으로서 1일 100mg을 리팜피신 600mg과 함께 장기투여한다. 3. 나병결절홍반과 같은 나병반응 이 약으로서 1일 1회 300mg을 보통 3개월간 투여한다. 투여기간 중 나병반응이 나타나면 즉시 나병반응 억제효과가 적절히 유지되는 수준까지 점차적으로 감량한다. (이하 동일)	1. 나병종나병과 중간나병 클로파지민으로서 1회 50mg을 매일 투여하거나 1회 100mg을 주 3회 투여한다. <삭 제> 2. 나병결절홍반과 같은 나병반응 이 약으로서 1일 1회 300mg을 보통 3개월간 투여한다. 투여기간 중 나병반응이 나타나면 즉시 나병반응 억제효과가 적절히 유지되는 수준까지 점차적으로 감량한다. (이하 동일)